



ANTICOCCHINILLAS TRATAMIENTO COMPLETO



FICHA TECNICA

INTRODUCCIÓN

El **TRATAMIENTO COMPLETO ANTICOCCHINILLAS** de FLOWER, es una mezcla fitosanitaria (Jabón fosfórico + aceite mineral + insecticida) que actúa por contacto, ingestión y asfixia contra cochinillas en cualquier estado, adulta o larva.



AUTORIZADO USO DOMESTICO- Jardineria Exterior

Doméstica

COMPOSICIÓN

Aceite mineral de verano, 83% p/v
Nº registro: 13.074.

Piriproxifen, 10% p/v
Nº registro: 19.675.

Solución NP en forma de jabón fosfórico
No requiere registro.

PRESENTACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

Se presenta en:
Caja con:
Botella de 100ml.
Botellín de 10ml.
Botella de 100ml.
Dosificador.

PRINCIPALES APLICACIONES

La aplicación conjunta del **TRATAMIENTO COMPLETO ANTICOCCHINILLAS** permite una acción curativa y preventiva, ya que por una parte el insecticida *Piriproxifen* actúa comportándose como una hormona juvenil, actuando sobre el crecimiento de la cochinilla, y por otra parte el insecticida con *Aceite mineral* actúa por asfixia sobre la cochinilla adulta, dejando sobre los árboles tratados una fina película protectora, cuya alta persistencia asegura su prolongada eficacia insecticida.

La presencia en el tratamiento con Jabón fosfórico conjuntamente con los 2 insecticidas, el cual actúa como fitofortificante frente a los efectos depresivos de la cochinilla, actuando como potenciador del efecto del tratamiento de los insecticidas contra la cochinilla.



Ataque de cochinilla



Cochinilla acanalada

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS.

- Mezclar 10 ml de ACEITE MINERAL + 8 ml de JABON FOSFORICO + 0,75 ml de INSECTICIDA PIRIPROXIFEN por litro de agua.

Aplicar en pulverización foliar normal con mochila, garantizando una buena cobertura de la pulverización, pulverizando bien todas las partes de la planta.

Recomendaciones de uso:

- Efectuar la mezcla en el momento de la aplicación.
- Calcular previamente la cantidad a consumir de caldo de tratamiento pues no es recomendable guardar la mezcla una vez ya hecha en el pulverizador o en la mochila de aplicación.
- Pulverizar abundantemente de modo que el caldo cubra por entero todas las partes del árbol.

Precauciones:

- Los tratamientos en cítricos se deberán dar antes del cambio de color de los frutos.
- No aplicar el producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre, ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos.
- Se deberán observar precauciones por la fitotoxicidad del producto para plantas herbáceas y para los frutales, especialmente los de hueso.

Plazo de seguridad: deben transcurrir 30 días entre la aplicación y la recolección en cítricos, 3 días en tomate, berenjena, pimiento y cucurbitáceas de piel comestible. En el resto de cultivos no procede establecer plazo de seguridad.

OBSERVACIONES

TRATAMIENTO COMPLETO ANTICOHINILLAS se trata de un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.